

tête cinq fois un tiers dans la longueur totale. Museau plus long que l'œil dont le diamètre est compris quatre fois un tiers dans la longueur de la tête; espace interorbitaire plus large que le diamètre de l'œil. Dorsale commençant à égale distance du pédicule de la caudale et du centre de l'œil; caudale échanocrée. Jannâtre, avec de nombreux points et des taches nuageuses noitrâtres; une large bande noire allant de l'œil à la caudale; dorsale et caudale rembrunies; dessus de la tête et extrémité du museau noir. Longueur, 0,470.

Nom vulgaire : *Abourra Moizon*.

Genre *Tribolodon*, n. gen. (1).

Écailles petites; ligne latérale recourbée en bas, mais se terminant au milieu de la caudale. Dorsale courte, avec moins de 9 rayons divisés, opposée aux ventrales; anale courte. Pas de barbillons; bouche petite; sousorbitaires non dilatés; des pseudobranchies. Dents pharyngiennes 3,2, recourbées en crochet. Peritoine piqueté de noir.

Du groupe des *Daniomina*.

26. *Tribolodon punctatum*, n. sp.

D. 9; A. 10; L. lat. 75.

Corps allongé, la hauteur étant contenue six fois et demie dans la longueur totale; tête cinq fois et un tiers dans la même dimension. Museau aussi long que l'œil, dont le diamètre est compris trois fois et demie dans la longueur de la tête; espace interorbitaire aussi large que le diamètre de l'œil. Dorsale commençant au milieu de l'espace compris entre l'extrémité du museau et l'origine de la caudale, un peu en avance sur les ventrales; cau-

1) *Recherches sur la faune ichthyologique de l'Indo-Chine*, p. 114.

dale échanocrée. Dessus de la tête noir; de petits points noirs sur les écailles; une bande cérulescente le long du dos; extrémité de la dorsale noire; ventrales jaunes. Longueur, 0,095.

27. *Misgurnus anguillicaudatus*, Cant. Nom local, *Kaype Mouchi*, *Razeron Hazami*.

M. Steenackers a également recueilli quelques espèces ne provenant pas du lac Bivako; ce sont :

28. *Centridermichthys fasciatus*, Hkl.

29. *Gobius uronema*, Hilgendorf. Nom local, *Hadye*.

30. *Gobius castaneus*, O'Schang.

31. *Eleotris obscura*, Schl.

32. *Anguilla bostonensis*, Les. ?

Sur une collection de poissons recueillie dans le Mé-Nam

(Siam) par M. Harmand,  
par M. H. E. SAUVAGE.

Depuis que nous avons publié le résultat de nos recherches sur la faune ichthyologique de l'Indo-Chine (1), M. le Dr Harmand, continuant ses fructueuses recherches, a adressé au Muséum une nombreuse collection de poissons recueillie dans le Mé-Nam; collection qui augmente singulièrement notre connaissance sur la faune ichthyologique du royaume de Siam. Les espèces recueillies par le savant voyageur sont les suivantes :

1. *Toxotes microlepis*, Gthr.

2. *Toxotes jaculator*, Pall.

(1) *Recherches sur la faune ichthyologique de l'Indo-Chine et description d'espèces nouvelles de l'Indo-Chine* (Nouv. Archives Muséum, 3<sup>e</sup> sér. t. IV.)

3. *Helostoma Temminckii*, K. V. H.
4. *Anabas scandens*, Dald.
5. *Trichopus trichopterus*, Pall.
6. *Trichopus siamensis*, Gthr.
7. *Trichopus parvipinnis*, Sauvg.
8. *Mastacembelus argus*, Gthr.
9. *Rhynchobdella aculeata*, Bl.
10. *Ophiocephalus micropeltus*, C. V.
11. *Ophiocephalus gachua*, H. B.
12. *Ophiocephalus striatus*, Bl.
13. *Ophiocephalus siamensis*, Gthr.
14. *Gobius giaris*, B. H.
15. *Eleotris butis*, B. H.
16. *Eleotris nanmorata*, Blkr.
17. *Eleotris urophthalmus*, Blkr.
18. *Boleophthalmus pectinirostris*, L.
19. *Periophthalmus Kabreuteri*, Pall.
20. *Periophthalmus Schlosseri*, Pall.
21. *Catopra fasciata*, Blkr.
22. *Catopra namoides*, Blkr.
23. *Cynoglossus solum*, Sauvg.
24. *Synaptura pannoidea*, Blkr.
25. *Hemirhamphus dispar*, C. V.
26. *Engraulis crocodilus*, Blkr.
27. *Engraulis melanochir*, Blkr.

28. *Notopterus kapurai*, Lac.
29. *Daugila siamensis*, Blkr.
30. *Rohita pectoralis*, Sauvg.
31. *Cirrhina Jullieni*, Sauvg.
32. *Cirrhina microlepis*, Sauvg.
33. *Osteochilus Hasseltii*, C. V.
34. *Osteochilus Schlegelii*, Blkr.
35. *Osteochilus melanopleurus*, Blkr.
36. *Hampala macrolepidota*, C. V.
37. *Amblyrhynchichthys trimaculata*, Blkr.
38. *Leptobarbus Herreni*, Blkr.
39. *Puntius siamensis*, n. sp.

D. 11; A. 11; L. lat. 28; L. trans. 5/3.

Corps élevé, comprimé. Hauteur contenue trois fois dans la longueur totale; longueur de la tête cinq fois un quart dans la même dimension. Quatre barbillons. Museau obtus, un peu plus court que le diamètre de l'œil, qui est compris trois fois un tiers dans la longueur de la tête; mâchoire supérieure recouvrant l'inférieure; des pores au museau. Origine de la dorsale à égale distance de l'extrémité du museau et de l'attache de la caudale; rayon osseux fortement et régulièrement dentelé, aussi long que la tête, sans le museau. Caudale fortement fourchue. Pectorales atteignant presque la base des ventrales. Ventrales au-dessous de la partie médiane de la dorsale. Trois rayons d'écaillés entre la ligne latérale et la base des ventrales. Coloration argentée; dos rembruni; bord de chaque écaillé marqué d'un trait noir; haut de la dorsale noir. Longueur, 0,110.

- 40. *Puntius leucantlus*, Blkr.
- 41. *Puntius albus*, Gthr.
- 42. *Puntius bramaoides*, C. V.
- 43. *Rasbora dasonensis*, Blkr.
- 44. *Rasbora Einthoveni*, Blkr.
- 45. *Macrochirichthys uranoscopus*, Blkr.
- 46. *Paralabuca siamensis*, Gthr.
- 47. *Paralabuca Harmandi*, n. sp.

D. 9; A. 24; L. lat. 75.

Hauteur du corps égale à la longueur de la tête, contenue 5 fois dans la longueur totale. Museau un peu plus court que l'œil, qui est contenu près de 3 1/2 fois dans la longueur de la tête. Bouche fort oblique; théroculé à la symphyse bien développé; maxillaire s'étendant jusqu'au niveau des ventrales, puis formant une courbe régulière. Origine de l'anale se trouvant entre les ventrales et l'anale, la nageoire se terminant un peu avant l'anale; pectorales pointues, dépassant l'origine des ventrales. Argenté; bord de la caudale noirâtre. Longueur, 0,170.

48. *Barrilius ornatus*, n. sp.

D. 10; A. 12; L. lat. 45.

Pas de barbillon. Hauteur contenue trois fois dans la longueur, sans la caudale; longueur de la tête quatre fois dans la même dimension. Maxillaire s'étendant jusqu'au niveau du centre de l'œil; mâchoires égales; museau pointu, conique, aussi long que le diamètre de l'œil, qui est compris trois fois et demie dans la longueur de la tête. Dorsale insérée à égale distance de la base de la

caudale et du centre de l'œil. Origine de l'anale opposée à la terminaison de la caudale. Pectorales atteignant les ventrales, aussi longues que la tête. Corps argenté avec une douzaine de bandes transversales de couleur bien d'acier. Longueur, 0,110.

- 49. *Botia modesta*, Blkr.
- 50. *Botia hymenophysa*, Blkr.
- 51. *Saccobranchius fossilis*, Bl.
- 52. *Clarius macrocephalus*, Gthr.
- 53. *Pangasius Larraudii*, Boct.
- 54. *Pangasius polyuranodon*, Blkr.
- 55. *Pangasius siamensis*, Steind.
- 56. *Pangasius pleurotoma*, Sauvg.
- 57. *Wallago attu*, Bl.
- 58. *Micronema Bleekeri*, Boct.
- 59. *Micronema hexapterus*, Blkr.
- 60. *Hemibagrus nemurus*, C. V.
- 61. *Ketengus typus*, Blkr.
- 62. *Hemipimelodus siamensis*, Sauvg.
- 63. *Bagroides macropterus*, Blkr.
- 64. *Bagroides melanopterus*, Blkr.
- 65. *Hemibarbus Harmandi*, Sauvg.
- 66. *Pseudotropius siamensis*, n. sp.

D. I, 6; A. 48; P. I, 8.

Hauteur du corps contenue cinq fois et demie, longueur de la tête quatre fois et demie dans la longueur totale.

Mâchoire inférieure à peine plus courte que la supérieure; dents du palais formant quatre amas distincts, bien que séparés par un faible intervalle; bande vomérienne un peu plus large que la bande formée par les dents maxillaires; barbillon nasal s'étendant presque jusqu'au niveau de la terminaison de l'anale; barbillons maxillaires externes un peu plus longs que les barbillons internes; yeux grands, placés très bas. Ventrales insérées au-dessous de la partie postérieure de la dorsale. Épine dorsale dentelée, ayant les trois quarts de la longueur de la tête. Anale se terminant à une certaine distance de la caudale. Épine pectorale forte, dentelée, s'étendant jusqu'à la base des ventrales, qui sont petites. Corps de couleur argentée, olivâtre en dessus; rayons externes des pectorales, partie supérieure de la dorsale noirs. Œil entouré d'un cercle noir; barbillon nasal de couleur très foncée. Longueur, 0,135.

67. *Pseudobagrus nudiceps*, n. sp.

D. 1/6; A. 23; P. 1/7.

Longueur de la tête contenue cinq fois dans la longueur totale. Dessus de la tête osseux, granuleux; processus occipital plus long que large, étroit; os basilaire triangulaire, aussi long que le processus occipital, partagé en deux par une suture transverse. Épine dorsale dentelée, aussi longue que la tête, sans le museau. Épine pectorale de même longueur que l'épine dorsale, très fortement dentelée. Adipeuse de même longueur que l'anale. Mâchoire supérieure plus longue que l'inférieure; dents du palais disposées suivant une bande rétrécie au milieu. Barbillons maxillaires s'étendant jusqu'à la pectorale. Longueur, 0,090.

68. *Microphis boaja*, BIKER.

69. *Tetraodon fuvialis*, H. B.

70. *Tetraodon palenbergensis*, Steind.

Description de quelques poissons de la collection du Muséum d'histoire naturelle;

par M. H. E. SAUVAGE (1).

47. *Apogon Suezii*, n. sp.

D. VI-1, 9; A. II, 8; L. lat. 22.

Suprascapulaire entier. Corps de couleur rougeâtre; trois bandes verticales noires, l'une partant de l'origine de la dorsale antérieure, la seconde du milieu de la dorsale molle, sur laquelle elle se prolonge, ainsi que sur l'anale, la troisième entourant la base de la caudale; une tâche noire entourée d'un cercle doré sur la bande antérieure; extrémité de l'anale noirâtre; caudale transparente. Longueur, 0,070.  
Suez: Letourneux.

48. *Scorpa Wienersi*, n. sp.

D. X-I, 22; A. II, 9; L. lat. 85.

Hauteur du corps égalant la longueur de la tête, contenue quatre fois deux tiers dans la longueur totale. Museau aussi long que l'espace qui sépare les yeux; mâchoire supérieure recouvrant légèrement l'inférieure; maxillaire dépassant un peu le niveau du bord postérieur de l'œil. Des pseudobranchies. Œil petit, son diamètre étant compris deux fois dans la longueur du museau et sept fois et demie dans la longueur de la tête. Préopercule arrondi, fortement denticulé sur tout son pourtour. Pectorales courtes. Caudale tronquée, aussi longue que la tête, sans le museau. Anale courte; épines très faibles. Une série

(1) Cf. Bull. Soc. Philomathique, séances des 12 juillet 1879, 24 juillet 1880, 14 mai 1881, 25 mars 1882.