

dale échancrée. Dessus de la tête noir; de petits points noirs sur les écailles; une bande cérulescente le long du dos; extrémité de la dorsale noire; ventrales jaunes. Longueur, 0,095.

27. *Misgurnus anguillicandatus*, Cant. Nom local, *Kappe Mouchi*, *Razeron Hazami*.

M. Steenachers a également recueilli quelques espèces ne provenant pas du lac Biwako; ce sont:

28. *Centridermichthys fasciatus*, Hkl.

29. *Gobius wrotania*, Hilgendorf. Nom local, *Hadjé*.

30. *Gobius castaneus*, O'Schlang.

31. *Eleotris obscura*, Schl.

32. *Anguilla bostonensis*, Les.

Sur une collection de poissons recueillie dans le Mé-Nam (Siam) par M. Harmand,  
par M. H. E. SAUVAGE.

Depuis que nous avons publié le résultat de nos recherches sur la faune ichthyologique de l'Indo-Chine (1), M. le Dr Harmand, continuant ses fructueuses recherches, a adressé au Muséum une nombreuse collection de poissons recueillie dans le Mé-Nam, collection qui augmente singulièrement notre connaissance sur la faune ichthyologique du royaume de Siam. Les espèces recueillies par le savant voyageur sont les suivantes:

1. *Toxotes microlepis*, Gthr.

2. *Toxotes jaculator*, Pall.

(1) Recherches sur la faune ichthyologique de l'Asie et description d'espèces nouvelles de l'Indo-Chine (Nouv. Archives Muséum, 2<sup>e</sup> sér. t. IV).

3. *Helostoma Temminckii*, K. V. H.

4. *Anabas scaudens*, Dald.

5. *Trichopus trichopterus*, Pall.

6. *Trichopus siamensis*, Gthr.

7. *Trichopus parvipinnis*, Sauv.

8. *Mastacembelus argus*, Gthr.

9. *Rhynchobdella aculeata*, Bl.

10. *Ophiocephalus micropeltes*, C. V.

11. *Ophiocephalus gachua*, H. B.

12. *Ophiocephalus striatus*, Bl.

13. *Ophiocephalus siamensis*, Gthr.

14. *Gobius giuris*, B. H.

15. *Eleotris butis*, B. H.

16. *Eleotris marmorata*, Blkr.

17. *Eleotris urophthalmus*, Blkr.

18. *Boleophthalmus pectinirostris*, L.

19. *Periophthalmus Kœlreuteri*, Pall.

20. *Periophthalmus Schlosseri*, Pall.

21. *Catopra fasciata*, Blkr.

22. *Catopra nandooides*, Blkr.

23. *Cynoglossus solon*, Sauv.

24. *Synaptura panoïdes*, Blkr.

25. *Hemirhamphus dispar*, C. V.

26. *Engraulis crocodilus*, Blkr.

27. *Engraulis melanoohir*, Blkr.

28. *Notopterus kapirot*, Lac.  
 29. *Dangila siamensis*, Blkr.  
 30. *Rohita pectoralis*, Sauvg.  
 31. *Cirrhinia Jullieni*, Sauvg.  
 32. *Cirrhinia microlepis*, Sauvg.  
 33. *Osteochilus Hasseltii*, C. V.  
 34. *Osteochilus Schlegelii*, Blkr.  
 35. *Osteochilus melanopleurus*, Blkr.  
 36. *Hampala macrolepidota*, C. V.  
 37. *Amblyrhynchichthys truncatus*, Blkr.  
 38. *Leptobarbus Heveni*, Blkr.

39. *Puntius siamensis*, n. sp.

D. 11; A. 11; L. lat. 28; L. trans. 5/3.

Corps élevé, comprimé. Hauteur contenue trois fois dans la longueur totale; longueur de la tête cinq fois un quart dans la même dimension. Quatre barbillons. Museau obtus, un peu plus court que le diamètre de la tête; compris trois fois un tiers dans la longueur de la tête; mâchoire supérieure recouvrant l'inférieure; des pores au milieu du museau et de l'attache de la caudale; des osseux fortement et régulièrement dentelés, aussi long que la tête, sans le museau. Caudale fortement fourchue. Pectorales atteignant presque la base des ventrales. Ventrales au-dessous de la partie médiane de la dorsale. Trois rangées d'écaillés entre la ligne latérale et la base des ventrales. Coloration argentée; dos rembruni; bord de chaque écaïlle marqué d'un trait noir; haut de la dorsale noir. Longueur, 0,110.

40. *Puntius leiocanthus*, Blkr.  
 41. *Puntius altus*, Gthr.  
 42. *Puntius bramoides*, C. V.  
 43. *Rasbora dasonensis*, Blkr.  
 44. *Rasbora Eindhoveni*, Blkr.  
 45. *Macrochirichthys wauscopus*, Blkr.  
 46. *Paralaubuca siamensis*, Gthr.  
 47. *Paralaubuca Harmandi*, n. sp.

D. 9; A. 24; L. lat. 75.

Hauteur du corps égale à la longueur de la tête, contenue 5 fois dans la longueur totale. Museau un peu plus court que l'œil, qui est contenu près de 3 1/2 fois dans la longueur de la tête. Bouche fort oblique; tubercule à la symphyse bien développé; maxillaire s'étendant jusqu'au niveau des ventrales, puis formant une courbe régulière. Origine de l'anale se trouvant entre les ventrales et l'anale, la nageoire se terminant un peu avant l'anale; pectorales pointues, dépassant l'origine des ventrales. Argenté; bord de la caudale noirâtre. Longueur, 0,170.

48. *Barilius ornatus*, n. sp.

D. 10; A. 12; L. lat. 45.

Pas de barbillon. Hauteur contenue trois fois dans la longueur, sans la caudale; longueur de la tête quatre fois dans la même dimension. Maxillaire s'étendant jusqu'au niveau du centre de l'œil; mâchoires égales; museau pointu, conique, aussi long que le diamètre de l'œil, qui est compris trois fois et demie dans la longueur de la tête. Dorsale insérée à égale distance de la base de la

caudale et du centre de l'œil. Origine de l'anale opposée à la terminaison de la caudale. Pectorales atteignant les ventrales, aussi longues que la tête. Corps argenté avec une douzaine de bandes transversales de couleur bleu d'acier. Longueur, 0,110.

49. *Botia modesta*, Blkr.  
 50. *Botia hymenophysa*, Blkr.  
 51. *Saccobranchus fossilis*, Bl.  
 52. *Clarias macrocephalus*, Gthr.  
 53. *Pangasius Larnaudi*, Boct.  
 54. *Pangasius polyuranodon*, Blkr.  
 55. *Pangasius siamensis*, Steind.  
 56. *Pangasius pleuroterenia*, Sauvg.  
 57. *Wallago attu*, Bl.  
 58. *Micronema Bleckeri*, Boct.  
 59. *Micronema hexapterus*, Blkr.  
 60. *Hemibagrus nemurus*, C. V.  
 61. *Kelengus typus*, Blkr.  
 62. *Hemipimelodus siamensis*, Sauvg.  
 63. *Bagroides macropterus*, Blkr.  
 64. *Bagroides melanopterus*, Blkr.  
 65. *Hemiaris Harmandi*, Sauvg.  
 66. *Pseudentropius siamensis*, n. sp.

D. I, 6; A. 48; P. I, 8.

Hauteur du corps contenue cinq fois et demie, longueur de la tête quatre fois et demie dans la longueur totale.

Mâchoire inférieure à peine plus courte que la supérieure; dents du palais formant quatre amas distincts, bien que séparés par un faible intervalle; bande vomérienne un peu plus large que la bande formée par les dents maxillaires; barbillon nasal s'étendant presque jusqu'au niveau de la terminaison de l'anale; barbillons maxillaires externes un peu plus longs que les barbillons internes; yeux grands, placés très bas. Ventrales insérées au-dessous de la partie postérieure de la dorsale. Épine dorsale dentelée, ayant les trois quarts de la longueur de la tête. Anale se terminant à une certaine distance de la caudale. Épine pectorale forte, dentelée, s'étendant jusqu'à la base des ventrales, qui sont petites. Corps de couleur argentée, olivâtre en dessus; rayons externes des pectorales, partie supérieure de la dorsale noirs. Œil entouré d'un cercle noir; barbillon nasal de couleur très foncée. Longueur, 0,435.

67. *Pseudobagrus nudiceps*, n. sp.

D. 1/6; A. 23; P. 1/7.

Longueur de la tête contenue cinq fois dans la longueur totale. Dessus de la tête osseux, granuleux; processus occipital plus long que large, étroit; os basilair triangulaire, aussi long que le processus occipital, partagé en deux par une suture transverse. Épine dorsale dentelée, aussi longue que la tête, sans le muscau. Épine pectorale de même longueur que l'épine dorsale, très fortement dentelée. Adipeuse de même longueur que l'anale. Mâchoire supérieure plus longue que l'inférieure; dents du palais disposées suivant une bande rétrécie au milieu. Barbillons maxillaires s'étendant jusqu'à la pectorale. Longueur, 0,090.

68. *Microphis boaja*, Blkr.

69. *Tetraodon fluviatilis*, H. B.

70. *Tetraodon palenbengensis*, Steind.